



**1. Comportamiento del evento**



**2. Comportamiento Inusual**



FUENTE: SIVIGILA 2018 - 2019

**3. Indicadores**  
Incidencia de sífilis congénita por 1 000 nacidos vivos

1,0  
 $22 / 21,759 * 1000$



Porcentaje de casos de sífilis congénita que cumplen definición de caso

86  
 $19 / 22 * 100$

Proporción de casos de sífilis congénita cuyas madres fueron notificadas como sífilis gestacional

81,8  
 $18 / 22 * 100$

**4. Datos Sociodemográficos**

Municipio de Residencia	Casos	%
Cucuta	8	36,4
El tarra	5	22,7
Villa del rosario	3	13,6
Tibu	2	9,1
Los patios	1	4,5
Ocaña	1	4,5
Sardinata	1	4,5
Teorama	1	4,5
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>100</b>


**6. Comportamiento de otras variables de interés**

Clasificación final de caso	Casos	%
Confirmado por Laboratorio	9	40,9
Confirmado por Clinica	1	4,5
Confirmado por Nexo Epodemiológico	12	54,5
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>100</b>



6.

**Condicion de la madre en el momento del Diagnostico**



7.

**Incidencia de Sifilis Congenita y entidad territorial de ocurrencia. Tasa por 1000 N.V.**

Municipio de Residencia	Casos	%	Incidencia x 1000 NV
Cucuta	8	36,4	678,1
El tarra	5	22,7	15,5
Villa del rosario	3	13,6	2,61
Tibu	2	9,1	1,8
Los patios	1	4,5	1,2
Ocaña	1	4,5	447,8
Sardinata	1	4,5	3,4
Teorama	1	4,5	5,7
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>19,02</b>

Fuente: Sivigila 2019

**Ficha técnica**

**Análisis de comportamientos inusuales:** La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

Por esta razón es necesario trabajar para lograr el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y más aun teniendo en cuenta que la sífilis no tratada durante el embarazo, especialmente la sífilis precoz, conlleva riesgo de muerte fetal intrauterina, nacimiento de un mortinato, muerte neonatal y secuelas importantes en los sobrevivientes.

