



1. Comportamiento del evento



Fuente: SIVIGILA 2020

2. Comportamiento Inusual



3. INDICADORES


Razón de prevalencia de sífilis gestacional por 1 000 nacido vivos

0,6



4.

Datos Sociodemográficos



5. Comportamiento de otras variables de interés

Régimen de afiliación "Contributivo"

5,5%

Régimen de afiliación "Subsidiado"

37,2 %

Régimen de afiliación "No Asegurado"

54,5%

Cabecera municipal

79,3%

Pertenencia étnica "otros"

97,9%

Población Migrante

45,5%

Fuente: SIVIGILA 2020

Tipo de Prueba Realizada	Treponémica	%	No Treponémica	%
Sí	139	95,9	141	97,2
No	6	4,1	4	2,8
Número de dosis de Tratamiento	Casos	%	Sin Tratamiento	%
1 Dosis	63	43,4	26	17,9
2 Dosis	5	3,4		
3 Dosis	51	35,2		

Fuente: SIVIGILA 2020

6. Incidencia de Sifilis Gestacional y entidad territorial de ocurrencia.

Otro Departamento y Exterior	Casos	%	Municipio de Residencia	Casos	Población DANE	Incidencia de casos x 100,000 Hab
Exterior	72	91,1	Cúcuta	83	680568	12,2
Amazonas	1	1,3	Cacota	1	1656	60,4
Cesár	4	5,1	Chiniacota	1	17173	5,8
Cundinamarca	1	1,3	Convencion	1	12239	8,2
Boyaca	1	1,3	Tibú	24	37455	64,1
			Villa del Rosario	4	99122	4,0
			Ocaña	12	101820	11,8
			Los Patios	3	80242	3,7
			Sardinata	2	22570	8,9
			El Zulia	4	12186	32,8
			Pamplona	3	59334	5,1
			La Playa	1	8567	11,7
			San Cayetano	1	5971	16,7
			El Carmen	1	12933	7,7
			Puerto Santander	1	11092	9,0
			El Tarra	3	11075	27,1

Fuente: Sivigila 2020

Fuente: Sivigila 2020

Ficha técnica

Análisis de comportamientos inusuales: La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

Por esta razón es necesario trabajar para lograr el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y más aun teniendo en cuenta que la sífilis no tratada durante el embarazo, especialmente la sífilis precoz, conlleva riesgo de muerte fetal intrauterina, nacimiento de un mortinato, muerte neonatal y secuelas importantes en los sobrevivientes.