



**1. Comportamiento del evento**



Fuente: SIVIGILA 2021

**2. Comportamiento Inusual**




**3. INDICADORES**

Razón de prevalencia de sífilis gestacional por 1 000 nacido vivos

**1,6**

CIFRAS PREELIMINARES DANE AÑO 2019

**4. Datos Sociodemográficos**



**5. Comportamiento de otras variables de interés**

**Tipo de régimen en salud**

CONTRIBUTIVO  
8%

SUBSIDIADO  
36,3 %

NO ASEGURADO  
55,4%

INDETERMINADO  
0,2%

ESPECIAL Y EXCEPCION  
0,2%

**Área**

**Pertenencia étnica**



Tipo de Prueba Realizada	Treponémica	%	No Treponémica	%
Sí	590	118,0	590	100,0
No	0	0,0	0	0,0
Número de dosis de Tratamiento	Casos	%	Sin Tratamiento	%
1 Dosis	180	30,5	135	22,9
2 Dosis	14	2,4		
3 Dosis	261	44,2		

Fuente: SIVIGILA 2021

**6. Incidencia de Sifilis Gestacional y entidad territorial de ocurrencia.**

Otro Departamento y Exterior	Casos	%	Municipio de Residencia	Casos COL.	Casos VEN.	Norte de Santander	%
			CUCUTA	154	155	309	52,4
			TIBU	32	64	96	16,3
			VILLA DEL ROSARIO	19	42	61	10,3
			OCAÑA	12	18	30	5,1
			EL TARRA	9	15	24	4,1
			EL ZULIA	12	7	19	3,2
			LOS PATIOS	7	5	12	2,0
			TEORAMA	3	4	7	1,2
			SARDINATA	3	3	6	1,0
			CONVENCION	3	2	5	0,8
			PAMPLONA	4	1	5	0,8
			EL CARMEN	3	1	4	0,7
			BOCHALEMA		2	2	0,3
			PUERTO SANTANDER	1	1	2	0,3
			TOLEDO	1	1	2	0,3
			ABREGO	1		1	0,2
			ARBOLEDAS	1		1	0,2
			CHINACOTA		1	1	0,2
			HACARI		1	1	0,2
			LA PLAYA	1		1	0,2
			MUTISCUA		1	1	0,2
			<b>Total General</b>	<b>266</b>	<b>322</b>	<b>590</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Sivigila 2021

**Ficha técnica**

**Análisis de comportamientos inusuales:** La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

Por esta razón es necesario trabajar para lograr el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y más aun teniendo en cuenta que la sífilis no tratada durante el embarazo, especialmente la sífilis precoz, conlleva riesgo de muerte fetal intrauterina, nacimiento de un mortinato, muerte neonatal y secuelas importantes en los sobrevivientes.