

1. INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS:

Casos Notificados por tipo de UCI y IAD Norte de Santander

Tipo de IAD	Tipo de Uci	Casos notificados	%
Infeccion del torrente sanguineo asociada a cateter (ITS-AC)	Uci Adulto	63	36,4
	Uci Neonatal	9	5,2
	Uci pediatrico	5	2,9
Neumonía asociada a ventilacion mecanico (NAV)	Uci Adulto	54	31,2
	Uci pediatrico	2	1,2
Infeccion del tracto urinario asociada a cateter (ISTU-AC)	Uci Adulto	39	22,5
	Uci pediatrico	1	0,6
Total		173	100

Fuente Sivigila 2022

Comportamiento social y demográfico de casos por tipo de IAD

Variable	Categoría	NAV	%	ISTU-AC	%	ITS-AC	%	Total IAD	%
Sexo	Masculino	38	22,0	24	13,9	46	26,6	108	62,4
	Femenino	18	10,4	16	9,2	31	17,9	65	37,6
Regimen de afiliacion	Subsidiado	33	19,1	23	13,3	37	21,4	93	53,8
	Contributivo	12	6,9	12	6,9	28	16,2	52	30,1
	Excepción	3	1,7	0	0,0	5	2,9	8	4,6
	No afiliado	7	4,0	5	2,9	7	4,0	19	11,0
	Indeterminado	1	0,6	0	0,0	0	0,0	1	0,6
	Especial	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Edad	> 1	2	1,2	1	0,6	11	6,4	14	8,1
	1 a 5	0	0,0	0	0,0	1	0,6	1	0,6
	6 a 10	1	0,6	0	0,0	1	0,6	2	1,2
	11 a 20	1	0,6	2	1,2	3	1,7	6	3,5
	21 a 30	6	3,5	1	0,6	4	2,3	11	6,4
	31 a 40	3	1,7	3	1,7	3	1,7	9	5,2
	41 a 50	10	5,8	7	4,0	7	4,0	24	13,9
	51 a 60	14	8,1	7	4,0	17	9,8	38	22,0
	61 a 70	16	9,2	8	4,6	13	7,5	37	21,4
71 a 80	15	8,7	9	5,2	13	7,5	37	21,4	
Comorbilidades	81 a 99	3	1,7	2	1,2	4	2,3	9	5,2
	Infeccion previa	20	11,6	8	4,6	24	13,9	52	30,1
	Obesidad	16	9,2	9	5,2	13	7,5	38	22,0
	Diabetes	16	9,2	4	2,3	12	6,9	32	18,5
	Enfermedad Renal	12	6,9	2	1,2	13	7,5	27	15,6
	Inmunosupresion	4	2,3	2	1,2	8	4,6	14	8,1
	EPOC	4	2,3	2	1,2	4	2,3	10	5,8
	Desnutricion	1	0,6	0	0,0	7	4,0	8	4,6
	Traumatismo	2	1,2	2	1,2	1	0,6	5	2,9
VIH	2	1,2	0	0,0	1	0,6	3	1,7	
Condicion final	Vivo	40	23,1	37	21,4	61	35,3	138	79,8
	Muerto	16	9,2	3	1,7	16	9,2	35	20,2

Fuente Sivigila 2022





Casos Notificados frecuentemente por tipo de Microorganismo de IAD

Microorganismos	NAV	ITS-AC	ISTU-AC
Pseudomonas aeruginosa	33,80	16,88	20,00
Enterobacter cloacae	2,82	2,60	1,20
Candida tropicalis	0,00	2,60	17,50
Candida auris	0,00	7,79	2,50
Candida albicans	0,00	2,60	12,50
Escherichia coli	1,41	5,19	20,00
Stenotrophomonas maltophilia	11,27	2,60	0,00
Acinetobacter baumannii	9,86	7,79	15,00
Klebsiella pneumoniae	5,63	15,58	10,00
Serratia marcescens	2,82	5,19	2,50
Staphylococcus epidermidis	0,00	5,19	0,00
Staphylococcus hominis	0,00	3,90	0,00
Staphylococcus haemolyticus	0,00	6,49	0,00
Enterococcus faecium	0,00	2,60	7,50
Enterococcus faecalis	0,00	7,79	5,00

Fuente Sivigila 2022


Factores de riesgo según el tipo de dispositivo insertado

Tipo de dispositivo insertado	Numero de dispositivo insertado	%
Cateter central	122	37,65
Ventilador	99	30,56
Cateter urinario	103	31,79
Total	324	100

Fuente Sivigila 2022

3. INFECCIÓN DE SITIO OPERATORIO (ISO)

Comportamiento de la notificación de ISO por procedimiento, Norte de Santander




Fuente Sivigila 2022



4.


ICONSUMO DE ANTIBIÓTICOS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO (CAB):

Dosis Diária Definida Hospitalizacion Adultos, Norte de Santander



Fuente Sivigila 2022

Dosis Diaria Definida Uci Adultos



Fuente Sivigila 2022

Ficha técnica

Análisis de comportamientos Inusuales: La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto Departamental de Salud (IDS) a través del sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después que se realicen ajustes en las UPGD.

