

1. INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS:

Casos Notificados por tipo de UCI y IAD Norte de Santander

Tipo de IAD	Tipo de Uci	Casos notificados	%
Infeccion del torrente sanguineo asociada a cateter (ITS-AC)	Uci Adulto	87	36,9
	Uci Neonatal	11	4,7
	Uci pediatrico	6	2,5
Neumonia asociada a ventilacion mecanico (NAV)	Uci Adulto	72	30,5
	Uci Neonatal	1	0,4
	Uci pediatrico	2	0,8
Infeccion del tracto urinario asociada a cateter (ISTU-AC)	Uci Adulto	56	23,7
	Uci pediatrico	1	0,4
Total		236	100

Fuente Sivigila 2022

Comportamiento social y demográfico de casos por tipo de IAD

Variable	Categoría	NAV	%	ISTU-AC	%	ITS-AC	%	Total IAD	%
Sexo	Masculino	54	22,9	32	13,6	59	25,0	145	61,4
	Femenino	21	8,9	25	10,6	45	19,1	91	38,6
Regimen de afiliacion	Subsidiado	46	19,5	34	14,4	54	22,9	134	56,8
	Contributivo	13	5,5	18	7,6	38	16,1	69	29,2
	Excepción	5	2,1	0	0,0	5	2,1	10	4,2
	No afiliado	10	4,2	5	2,1	7	3,0	22	9,3
	Indeterminado	1	0,4	0	0,0	0	0,0	1	0,4
	Especial	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Edad	> 1	3	1,3	1	0,4	14	5,9	18	7,6
	1 a 5	0	0,0	0	0,0	1	0,4	1	0,4
	6 a 10	1	0,4	0	0,0	1	0,4	2	0,8
	11 a 20	1	0,4	3	1,3	3	1,3	7	3,0
	21 a 30	8	3,4	3	1,3	5	2,1	16	6,8
	31 a 40	4	1,7	6	2,5	8	3,4	18	7,6
	41 a 50	13	5,5	10	4,2	9	3,8	32	13,6
	51 a 60	18	7,6	8	3,4	20	8,5	46	19,5
	61 a 70	20	8,5	10	4,2	19	8,1	49	20,8
	71 a 80	18	7,6	12	5,1	19	8,1	49	20,8
81 a 99	5	2,1	4	1,7	5	2,1	14	5,9	
Comorbilidades	Infeccion previa	21	8,9	13	5,5	39	16,5	73	30,9
	Obesidad	18	7,6	12	5,1	19	8,1	49	20,8
	Diabetes	18	7,6	7	3,0	12	5,1	37	15,7
	Enfermedad Renal	15	6,4	3	1,3	13	5,5	31	13,1
	Inmunosupresion	4	1,7	2	0,8	10	4,2	16	6,8
	EPOC	6	2,5	3	1,3	7	3,0	16	6,8
	Desnutricion	4	1,7	1	0,4	7	3,0	12	5,1
	Traumatismo	3	1,3	2	0,8	3	1,3	8	3,4
Condicion final	Vivo	55	23,3	52	22,0	85	36,0	192	81,4
	Muerto	20	8,5	5	2,1	19	8,1	44	18,6

Fuente Sivigila 2022



Casos Notificados frecuentemente por tipo de Microorganismo de IAD

Microorganismos	NAV	ITS-AC	ISTU-AC
Pseudomonas aeruginosa	36,90	20,19	18,18
Enterobacter cloacae	2,38	3,88	3,64
Candida tropicalis	0,00	1,94	12,73
Candida auris	0,00	7,77	0,00
Candida albicans	0,00	1,94	12,73
Escherichia coli	1,19	3,88	21,82
Stenotrophomonas maltophilia	11,90	2,91	0,00
Acinetobacter baumannii	13,10	5,83	0,00
Klebsiella pneumoniae	7,14	14,15	12,73
Serratia marcescens	2,38	4,85	1,82
Staphylococcus epidermidis	0,00	7,77	0,00
Staphylococcus hominis	0,00	2,91	0,00
Staphylococcus aureus	0,00	2,88	0,00
Staphylococcus haemolyticus	0,00	4,85	0,00
Proteus mirabilis	2,38	0,00	3,64
Enterococcus faecium	0,00	2,91	5,45
Enterococcus faecalis	0,00	6,80	3,64

Fuente Sivigila 2022

Factores de riesgo según el tipo de dispositivo insertado


Tipo de dispositivo insertado	Numero de dispositivo insertado	%
Cateter central	165	37,67
Ventilador	134	30,59
Cateter urinario	139	31,74
Total	438	100

Fuente Sivigila 2022

3.

INFECCIÓN DE SITIO OPERATORIO (ISO)

Comportamiento de la notificación de ISO por procedimiento, Norte de Santander



Fuente Sivigila 2022






4.


ICONSUMO DE ANTIBIÓTICOS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO (CAB):

Dosis Diária Definida Hospitalizacion Adultos, Norte de Santander



Fuente Sivigila 2022

Dosis Diaria Definida Uci Adultos



Fuente Sivigila 2022

Ficha técnica

Análisis de comportamientos Inusuales: La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto Departamental de Salud (IDS) a través del sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después que se realicen ajustes en las UPGD.

