





No. de casos 318


### 1 Comportamiento de la notificación del evento ESI-IRAG



### 2 Circulación viral en la unidad centinela de Norte de Santander



### 3 Identificación de agente viral por grupo de edad



**4 Variables sociodemográficas**



Hombres  
61,0 %  
194 casos



Mujeres  
39,0 %  
124 casos



IRAG

Hospitalizados  
99,4 %  
316 casos



ESI

Ambulatorio  
0,6 %  
2 casos




Nacionalidad

Colombia 80,5 % 256 casos  
Venezuela 19,2 % 61 casos  
Malta 0,3 % 1 caso

Variable	Categoría	No casos	%
Área de Ocurrencia	Cabecera Municipal	273	85,8
	Centro Poblado	23	7,2
	Rural Disperso	22	6,9
Pertenenencia étnica	Otro	315	99,1
	Indígena	2	0,6
Régimen de afiliación	Raizal	1	0,3
	Subsidiado	212	66,7
	No Asegurado	64	20,1
	Excepción	38	11,9
	Contributivo	4	1,3

EAPB	No de casos	%
Nueva EPS SA	107	33,6
No asegurado	64	20,1
Comfaorient	37	11,6
Policia Nacional	34	10,7
Sanitas	28	8,8
Ecoopsos	25	7,9
Compensar	5	1,6
Salud Total	3	0,9
Savia Salud	3	0,9
Capital Salud	3	0,9
Res Fondo Prestacion Social	2	0,6
Asmet Salud ESS	2	0,6
Famisanar	1	0,3
Fuerzas Militares	1	0,3
Uisalud	1	0,3
Mutual SER ESS	1	0,3
Coosalud	1	0,3
<b>Norte de Santander</b>	<b>318</b>	<b>100</b>



**5 Indicadores**



La UPGD centinela ha cumplido con el **100%** de la notificación.

**Ficha técnica:**

De acuerdo con la base de datos suministrada para el análisis, se realizó depuración de la misma, se excluyeron los registros de semanas posteriores al corte del período epidemiológico V (semana 01 a 20), los registros con error de digitación (ajuste D), los registros repetidos y los registros duplicados por número de documento de identificación, nombre completo y fecha de inicio de síntomas. Los casos con ajuste 6 no se excluyeron del análisis de este evento puesto que para infección respiratoria un paciente puede tener toda la presentación clínica y un resultado negativo por laboratorio. Por lo tanto, el análisis incluye los casos con ajuste 0, 3 y 6.

Para el análisis del comportamiento inusual se tiene en cuenta el canal endémico, se utilizó como dato de entrada el número de casos de ESI-IRAG notificados por semana epidemiológica. La elaboración se realizó por la técnica de Bortman; se calculó el umbral estacional teniendo en cuenta el promedio de notificación por semana epidemiológica de los años 2016 a 2022, y se definieron los límites de control que permitieran evidenciar el riesgo de epidemia. Se excluyó el año 2020.

Para el cálculo del indicador del porcentaje de cumplimiento en la notificación, se tienen en cuenta el número de casos notificados por período epidemiológico, con base en la notificación de mínimo 5 casos por semana, se considera como cumplimiento mínimo 20 casos por período epidemiológico para cada una de las estrategias de ESI-IRAG. Para este informe se evalúan 5 períodos epidemiológicos. Para un porcentaje de cumplimiento del 100% se deben tener 5 períodos epidemiológicos con cumplimiento

Se presentan las variables sociodemográficas más importantes con frecuencia relativa de casos por grupo de edad, sexo y otras variables para el análisis epidemiológico. Se realizó el análisis de la circulación de virus respiratorios identificados por la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz, unidad centinela del departamento por semana epidemiológica a período epidemiológico V de 2023.