

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	 Gobernación de Norte de Santander Instituto Departamental de Salud
Código: F-DE-PE05-03 Versión: 05	COMUNICACION EXTERNA	Página 1 de 11

**Informe de evento primer trimestre Vigilancia integrada de muertes en menores de cinco años por
Infección Respiratoria Aguda (IRA), Enfermedad Diarréica Aguda (EDA) y Desnutrición (DNT) Aguda, Norte
de Santander, Semanas epidemiológicas 01 a 12, 2025pr**

WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO
Gobernador

FERNANDO AUGUSTO ALVAREZ GARCÍA
Director IDS

GLORIA MONTAÑO
P.E Coordinador Grupo de Salud Pública

SANDRA MILENA CORREDOR BLANCO
P.U Responsable Vigilancia en Salud Pública

YESENIA MAIRUTH QUINTERO CARRASCAL
Profesional de apoyo evento

Norte de Santander, 2025

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	 Gobernación de Norte de Santander Instituto Departamental de Salud
Código: F-DE-PE05-03 Versión: 05	COMUNICACION EXTERNA	Página 2 de 11

Informe de evento primer trimestre Vigilancia integrada de muertes en menores de cinco años por Infección Respiratoria Aguda (IRA), Enfermedad Diarréica Aguda (EDA) y Desnutrición (DNT) Aguda, Norte de Santander, Semanas epidemiológicas 01 a 12, 2025pr

1. Introducción

La Vigilancia integrada de muertes de menores de cinco años por Infección Respiratoria Aguda (IRA), Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) o Desnutrición (DNT) aguda se relaciona con el derecho a la existencia de los niños (1) y la mortalidad evitable en la niñez (2).

Muchas de estas muertes por IRA, EDA o DNT aguda se consideran evitables (3); por lo que uno de los fines de las políticas de salud debe ser reducir la mortalidad, mediante la intervención de aquellos factores que aumentan el riesgo de morir. Además, muchas de estas muertes se encuentran dentro del contexto de bajo nivel socioeconómico, falta de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico (4). Recordándonos la importancia que tienen los determinantes sociales en salud en la incidencia de este tipo de muertes y la necesidad de identificarlos para la generación de políticas públicas en salud adecuadas. Lo anterior se encuentra acorde con los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2015 donde se propone disminuir las muertes en menores de cinco años a 25 por cada 1 000 nacidos vivos en todos los países.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se han logrado progresos en la supervivencia y el bienestar de los niños menores de cinco años en el mundo. Entre 1990 y 2021 ha disminuido el número de muertes en menores de cinco años de 12,8 millones a 5,0 millones lo que corresponde a un descenso aproximado del 60% (5).

Las enfermedades infecciosas como la neumonía, la diarrea y el paludismo, junto con el parto prematuro y las complicaciones asociadas al parto continúan como las principales causas de defunción de niños menores de cinco años. hasta el 45 % de las muertes en menores de cinco años están influenciadas por las condiciones nutricionales de los niños y niñas (6).

El informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de 2020 de América Latina relata avances en la sobrevivencia de los niños menores de cinco años. Entre 1990 y 2018, las muertes de niños y niñas en este grupo de edad, en esta región, han disminuido en 73,1 % (7).

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se presenta un mayor riesgo de malnutrición por el aumento de la pobreza y pobreza extrema en la región desde el inicio de la pandemia por el COVID-19 (8).

Respecto a la mortalidad por IRA o EDA, en Latinoamérica y el Caribe, se reportaron 28 840 muertes por enfermedad diarreica en 2019, de estas el 32,7 % (9 450) fueron en menores de cinco años. Para el mismo año, se reportaron 140 muertes por neumonía en menores de cinco años, este dato corresponde al 3 % de las defunciones por neumonía en menores de cinco años a nivel mundial (9).

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	 Gobernación de Norte de Santander Instituto Departamental de Salud
Código: F-DE-PE05-03 Versión: 05	COMUNICACION EXTERNA	Página 3 de 11

Según Naciones Unidas, la tasa de mortalidad de los menores de cinco años en Colombia ha tenido un descenso entre 1960 y 2021, de 135 muertes por cada 1 000 nacidos vivos a 13 por cada 1 000 nacidos vivos, para una reducción de 90,4 % (10).

La fuente oficial de la información de mortalidad en el país es el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), la información derivada de la vigilancia epidemiológica es sólo una de las fuentes de información para conocer el comportamiento de la mortalidad, existen otras fuentes que son consolidadas por el DANE y no ingresan al Sistema de Vigilancia en Salud Pública del país (Sivigila).

Según el DANE, se estima que la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años para el 2022 fue 9,1 por cada 100 000 menores de cinco años, siendo valores superiores al 2021. Las tasas más altas para 2022 estuvieron en La Guajira, seguida por Chocó y Vichada. En cuanto a la mortalidad por IRA en niños y niñas menores de cinco años, el número de defunciones disminuyó 18 % para 2022 en relación con el promedio observado entre 2015 y 2019. No obstante, en 2022 se incrementó el número de casos en 47,6 % frente a 2021. En el caso de la EDA, la tasa de mortalidad por cada 100 000 niños menores de cinco años aumentó de 4,4 al 4,6 (173 a 181 casos) entre 2021 y 2022, con las tasas más altas en La Guajira, Choco y Vichada (11).

En el departamento de Norte de Santander se notificaron 21 casos durante el año 2024, lo que corresponde a una disminución de 34,4% en la notificación, al compararlo con el mismo periodo del año 2023 (29 casos) Para el año 2025 se han notificado 2 casos. (12).

Los casos de mortalidad en menores de cinco años por IRA, EDA y DNT aguda se analizan por unidad de análisis según lineamientos nacionales del Instituto Nacional de Salud. Este proceso consiste en analizar los casos según su notificación y programación por parte del ente departamental generando en cada unidad de análisis de casos confirmados tablero de problemas lo que permite identificar determinantes sociales de la salud que pueden favorecer la ocurrencia del evento con el desenlace fatal del caso. A partir de la divulgación de este tablero de problemas generado se permite crear acciones de mejora en las instituciones involucradas en la atención del caso.

2. Objetivos

El objetivo de este informe es describir el comportamiento de las muertes en menores de cinco años por IRA, EDA y DNT aguda y el seguimiento a los indicadores de la vigilancia en Norte de Santander durante las semanas epidemiológicas 1 a 12 de 2025. Los datos aquí presentados son preliminares y están sujetos a cambios según los resultados de las unidades análisis.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	 Gobernación de Norte de Santander Instituto Departamental de Salud
Código: F-DE-PE05-03 Versión: 05	COMUNICACION EXTERNA	Página 4 de 11

3. Materiales y métodos

Se realizó un informe de análisis de transversal descriptivo de la situación actual de la notificación para caracterizar la situación epidemiológica del evento en menores de cinco años a semana epidemiológica 12 de 2025 en Norte de Santander, detectados a través del sistema de vigilancia en salud pública (SIVIGILA) web, posterior proceso depuración del 1 de enero a 22 de marzo de 2025. Los casos fueron analizados de manera integrada y desagregada por cada evento y según municipio de residencia (40 municipios). Se depuró la base de datos excluyendo los casos con ajuste D (error de digitación), y ajuste 6 (descartado). Para el informe se incluyen únicamente los casos notificados y residentes en Colombia por no tener a este corte casos confirmados para el evento. Se verificó la consistencia interna de los registros por medio de la revisión de la unidad de análisis de cada caso.

Teniendo como definición operativa de caso como caso confirmado todos las **muertes confirmadas por clínica para Desnutrición (DNT) aguda moderada o severa** todo caso probable de muerte en menores de cinco años (entre 0 y 59 meses de edad) en el que mediante unidad de análisis se confirman los criterios clínicos para desnutrición aguda moderada o severa definidos según resolución 2350 de 2020 del MSPS y protocolo de Vigilancia de Desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años (0 a 59 meses); **muertes confirmadas por clínica para Infección Respiratoria Aguda (IRA)** todo caso probable de muerte en menores de cinco años (entre 0 y 59 meses de edad) en el que mediante unidad de análisis se confirman criterios clínicos o radiológicos para infección respiratoria aguda que expliquen la cascada fisiopatológica de defunción y en el que no se identifique agente etiológico y **muertes confirmadas por clínica para Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)** todo caso probable de muerte en menores de cinco años (entre 0 y 59 meses de edad) en el que mediante unidad de análisis se confirman criterios clínicos para enfermedad diarreica aguda que expliquen la cascada fisiopatológica de defunción y que no cuenten con identificación de agente etiológico. (Ver Guía de práctica clínica para prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad diarreica aguda en niños menores de 5 años.

Se utilizaron las variables de sexo, edad, régimen de afiliación, estrato socio económico, nivel educativo de la madre, pertenencia étnica, área de residencia, municipio de residencia, clasificación de la muerte. Los indicadores analizados fueron: Casos notificados a semana epidemiológica 12 por municipio de residencia, tasa de mortalidad en menores de 5 años por DNT, EDA e IRA, cumplimiento y oportunidad de las unidades de análisis correspondientes a los casos notificados (se cuenta con 5 semanas epidemiológicas a partir de la fecha de notificación del caso para realizar y enviar la unidad de análisis correspondiente, según lo establecido en los lineamientos nacionales para unidades de análisis del INS), proporción de muertes por IRA en menores de cinco años con muestra respiratoria, Correspondencia entre Sivigila y el módulo de defunciones del RUAF y cumplimiento en la realización de investigación epidemiológica de campo de muertes en menores de cinco años por IRA, EDA y DNT aguda.

La fuente oficial de la información de la mortalidad en Norte de Santander es el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), la información derivada de la vigilancia epidemiológica es sólo una de las

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	 Gobernación de Norte de Santander Instituto Departamental de Salud
Código: F-DE-PE05-03 Versión: 05	COMUNICACION EXTERNA	Página 5 de 11

fuentes de información para conocer el comportamiento de la mortalidad; existen otras fuentes que son consolidadas por el DANE y no ingresan al Sivigila. Teniendo eso en cuenta se analizó correspondencia Sivigila-RUAF usando como numerador el total de casos notificados a Sivigila y como denominador el total de casos notificados a Sivigila más los casos identificados por cruce RUAF-Sivigila que cumplen con la definición operativa del evento y no fueron notificados.

El presente informe de evento corresponde al análisis de la notificación del evento de interés en salud pública vigilancia integrada de las muertes en menores de cinco años por IRA, EDA o DNT aguda código 591, los datos para el análisis corresponden a los diligenciados en el registro administrativo Sivigila y no se le realizó modificación alguna a las variables notificadas.

Por otro lado, el análisis de tablero de problemas cuando se presentan casos confirmados se realiza de manera descriptiva dentro del informe teniendo en cuenta las características de individuo y problemas asociados a los servicios de salud los cuales se pueden encontrar en el Manual para la realización de unidades de análisis de eventos de interés en salud pública.


4. Resultados

Durante las semanas epidemiológicas 1 a 12 de 2025 se han notificado al Sivigila 2 muertes probables por infección respiratoria aguda y desnutrición aguda los cuales fueron descartados por unidad de análisis. No se presentaron casos con errores de digitación.

Los 2 casos notificados al evento en lo recorrido de 2025 corresponden a una disminución en número de casos notificados, al compararlo con el mismo período del año 2024 donde se habían notificado 8 casos con una variación porcentual de 75%. La tasa de mortalidad por desnutrición aguda es de 0 muertes por cada 100.000 menores de cinco años; y una tasa de mortalidad por IRA de 0 muertes por cada 100.000 menores de cinco años. **La tasa preliminar de mortalidad integrada en menores de cinco años por IRA, EDA o DNT aguda a semana epidemiológica 12 de 2025 es de 0 muertes por cada 100.000 menores de cinco años.**

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	 Gobernación de Norte de Santander Instituto Departamental de Salud
Código: F-DE-PE05-03 Versión: 05	COMUNICACION EXTERNA	Página 6 de 11

Figura 1. Tendencia de la tasa de mortalidad integrada en menores de cinco años por IRA, EDA o DNT aguda, semanas epidemiológicas 1-12, Norte de Santander, 2020-2025pr



Fuente: Instituto Departamental de Salud, Sivigila 2025

Análisis de variables sociales y demográficas

Al realizar un comparativo con el año 2024 para el mismo período; en el 2024 el 50% de los casos corresponden a menores y el otro 50% a mayores de un año, al igual que el sexo estaba distribuido de una manera equitativa. El 75% (6 casos) tenían aseguramiento en salud en el régimen subsidiado. El área de residencia es en el centro poblado y rural disperso tenía su mayor concentración en la zona rural. En el 100% (8 casos) de las muertes en los menores la madre no tenía escolaridad y vivía en zona de estrato socioeconómico uno. Para el 2025 no se han confirmado casos para el evento.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	 Gobernación de Norte de Santander Instituto Departamental de Salud
Código: F-DE-PE05-03 Versión: 05	COMUNICACION EXTERNA	Página 7 de 11

Tabla 1. Muertes confirmadas en menores de cinco años por IRA, EDA o DNT aguda según variables sociales y demográficas semanas epidemiológicas 1-12, Norte de Santander, 2024-2025pr

Característica	Categoría	DNT		IRA		EDA		Total		Porcentaje	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Edad	Menores 1 año	2	0	0	0	2	0	4	0	50,0	0,0
	1 a 4 años	2	0	2	0	0	0	4	0	50,0	0,0
Sexo	Masculino	3	0	0	0	1	0	4	0	50,0	0,0
	Femenino	1	0	2	0	1	0	4	0	50,0	0,0
Área de ocurrencia	Cabecera municipal	2	0	0	0	0	0	2	0	25,0	0,0
	Centro poblado y rural disperso	2	0	2	0	2	0	6	0	75,0	0,0
Régimen de aseguramiento	Subsidiado	4	0	2	0	0	0	6	0	75,0	0,0
	Contributivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	No afiliado	0	0	0	0	2	0	2	0	25,0	0,0

Fuente: Instituto Departamental de Salud, Sivigila 2025

Pertenencia étnica indígena

De las 2 muertes notificadas residentes de Norte de Santander en menores de cinco años por IRA, EDA o DNT el total correspondían a otras etnias.

Tablero de problemas

Al corte de semana epidemiológica 12 no se han confirmado casos de mortalidad en menores de 5 años por lo tanto no se generaron tablero de problemas.

Sin embargo, al realizar comparación con el año 2024; se observó para el primer trimestre 62 registros de los cuales más del 60% correspondieron a problemas con el individuo.

Según comportamiento de inusuales, teniendo en cuenta la totalidad de casos notificados y confirmados de muerte por DNT aguda; a semana epidemiológica 12 se observa un comportamiento estable de casos.

El porcentaje de investigaciones epidemiológicas de campo de las muertes en menores de cinco años por IRA, EDA y DNT aguda realizadas oportunamente para el departamento de Norte de Santander a semana epidemiológica 12 es del 100%.

Correspondencia nacional Sivigila-DANE

La correspondencia entre las diversas fuentes de información se realiza a través del cruce de bases de datos, en este caso entre las bases RUAF y Sivigila, con el objetivo de encontrar registros de muertes que no estén notificados al Sivigila y que cumplan con definición operativa de caso, permitiendo dar una medida de la completitud de la información presente en las bases del sistema de vigilancia. Para el departamento de Norte de Santander para IRA es de 50%, DNT aguda es de 100%.

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	 Gobernación de Norte de Santander Instituto Departamental de Salud
Código: F-DE-PE05-03 Versión: 05	COMUNICACION EXTERNA	Página 8 de 11

Indicadores de unidades de análisis

Dentro de los indicadores más importantes de la vigilancia integrada de las muertes en menores de 5 años, se encuentran el cumplimiento y la oportunidad de la realización de las unidades de análisis de los casos que permiten realizar la clasificación final de los mismos. Teniendo en cuenta que las entidades territoriales tienen 5 semanas epidemiológicas a partir de la notificación del caso para hacer la correspondiente unidad de análisis para la mayoría de los eventos priorizados, el cumplimiento en el cargue de la información es del 100%, y un 100% de correspondencia entre casos confirmados y tablero de problemas.

Tabla 2. Unidades de análisis de casos de mortalidad en menores de 5 años por infección respiratoria aguda IRA, enfermedad diarreica aguda EDA y desnutrición DNT aguda, semanas epidemiológicas 1-12, Norte de Santander 2025pr

Evento	Muertes notificadas	Clasificación unidad de análisis				Porcentaje analizado
		Confirmado por Clínica	Confirmada por laboratorio	Descartada	No concluyente	
DNT	1			1		100%
IRA	1			1		100%
EDA	0					

Fuente: Instituto Departamental de Salud, Sivigila 2025

5. Discusión

En 2025 durante las semanas epidemiológicas 1 a 12 se ha presentado una disminución de los casos confirmados para el evento integrado de mortalidad específicamente por DNT aguda (0 casos) en comparación con el 2024 en el mismo período donde solo se confirmaron 4 casos durante todo el año y una disminución de casos en muertes por IRA (13).

La tasa de mortalidad por DNT aguda, IRA y EDA es de 0 muertes por cada 100.000 menores de 5 años.

Los casos notificados para el evento integrado se presentaron en menores de un año, similar al del comportamiento que arroja el nivel nacional. El área de ocurrencia más frecuente fue el centro poblado y rural disperso de padres con condiciones socioeconómicas bajas.

En cuanto a los indicadores de unidades de análisis se observa un aumento en la oportunidad de cargue al aplicativo; sin embargo, los casos de mortalidad presentados a inicios de año en el departamento se realizaron de manera inoportuna por el ingreso de recurso humano para su análisis de manera inmediata. Sin embargo, es un comportamiento similar al registro a nivel país.

En lo que respecta al tablero de problemas no se generaron debido a que no existen casos confirmados a este corte.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	 Gobernación de Norte de Santander Instituto Departamental de Salud
Código: F-DE-PE05-03 Versión: 05	COMUNICACION EXTERNA	Página 9 de 11

6. Limitaciones

- ✓ La única fuente de información para realizar el informe del evento de vigilancia integrada de muerte en menores de 5 años por EDA, IRA y DNT aguda es el sistema de información Sivigila.
- ✓ Los tiempos entre el resultado de la necropsia y la realización de la unidad de análisis son muy cortos.
- ✓ Los diferentes informes solicitados por entes de control hacen que el tiempo sea limitado para la realización del informe del evento.

7. Conclusiones

- ✓ La notificación muestra un descenso en comparación con el mismo período en el año 2024.
- ✓ Las muertes en menores de cinco años por IRA, EDA o DNT aguda fueron más frecuentes en mayores de un año, sexo masculino, aseguramiento en salud en el régimen subsidiado, residentes de la zona rural y quienes vivían en zona de estrato socioeconómico uno.
- ✓ El indicador de cumplimiento de unidades de análisis presentó un ascenso respecto al año anterior.
- ✓ El indicador de oportunidad de unidades de análisis presentó un ascenso respecto al año anterior.
- ✓ La tasa de mortalidad por DNT aguda en menores de cinco años a semana epidemiológica 12 es menor que en el 2024.
- ✓ La tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años a semana epidemiológica 12 es más baja que en el 2024.

8. Recomendaciones

- ✓ Departamento: Garantizar la continuidad del personal contratado para vigilancia en salud pública en el departamento con el objetivo de dar cumplimiento a la realización de unidades de análisis y sus indicadores.
- ✓ IPS de los 40 municipios: Garantizar por parte de las IPS la toma de muestra a todas las muertes probables en menores de cinco años por IRA y EDA, por parte de las instituciones prestadoras de servicios en salud, de acuerdo con lo establecido en el protocolo de vigilancia.

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	 Gobernación de Norte de Santander Instituto Departamental de Salud
Código: F-DE-PE05-03 Versión: 05	COMUNICACION EXTERNA	Página 10 de 11

- ✓ Departamento: Continuar desde el IDS con el acompañamiento a los municipios del departamento en cuanto al proceso y metodología de unidades de análisis e inquietudes permanentes en su realización.
- ✓ Departamento: Fortalecer desde el departamento en el talento humano de las IPS en conocimientos y habilidades para el adecuado diligenciamiento del certificado de defunción para la adecuada identificación de los casos que cumplen con criterios para ser notificados para el evento.
- ✓ Departamento: Continuar por parte del ente departamental con la divulgación de tablero de problemas de los casos confirmados en las unidades de análisis de análisis con la participación activa de los programas de salud pública, EAPB, Municipios, IPS, Gobernación y demás sectores que puedan aportar en los problemas encontrados.

9. Bibliografía

1. UNICEF. Análisis de situación de la niñez en Colombia (2014) – Actualización con base en ENDS (2015). 2017 [citado el 22 de noviembre de 2023];1–22. Disponible en: https://unicef.org.co/sitan/assets/pdf/sitan_2017.pdf
2. Rojas-Botero ML, Ramírez YEB, de María Cáceres-Manrique F. Avoidable childhood deaths: An analysis by department and municipality in Colombia (2000-2018). Revista Panamericana de Salud Publica/Pan American Journal of Public Health. 2021;46.
3. Rutstein DD BWCTCC 3rd, FAPE. Mesasuring the quality of medical care. A clinical method. N Engl J Med. marzo de 1976;294(11):582–8.
4. Alfonso Chang Y, Gómez García N, Quintana Gómez F, Pimienta Pérez N, Gaudencia González Díaz J, Suárez Morales O, et al. Determinantes sociales que inciden en la mortalidad de los menores de cinco años [Internet]. Vol. 14, Acta Médica del Centro. 2020 [citado el 18 de abril de 2024]. Disponible en: <https://revactamedicacentro.sld.cu/index.php/amc/article/view/1362/1402>.
5. Madewell ZJ, Whitney CG, Velaphi S, Mutevedzi P, Mahtab S, Madhi SA, et al. Prioritizing Health Care Strategies to Reduce Childhood Mortality. JAMA Netw Open. el 21 de octubre de 2022;5(10):E2237689.
6. UNICEF. Under-five mortality [Internet]. 2024 [citado el 18 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://data.unicef.org/topic/childsurvival/under-fivemortality/#:~:text=The%20global%20under%2Dfive%20mortality,a%20matter%20of%20urgent%20concern>.
7. UNICEF. Niños y niñas en América Latina y el Caribe. Panorama 2020. [Internet]. 2020 oct [citado el 23 de noviembre de 2023]. Disponible en: <https://www.unicef.org/lac/informes/ninos-y-ninas-en-america-latina-y-elcaribe-2020>.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	 Gobernación de Norte de Santander Instituto Departamental de Salud
Código: F-DE-PE05-03 Versión: 05	COMUNICACION EXTERNA	Página 11 de 11

8. Castillo C, Marinho ML. Los impactos de la pandemia sobre la salud y el bienestar de niños y niñas en América Latina y el Caribe La urgencia de avanzar hacia sistemas de protección social sensibles a los derechos de la niñez [Internet]. 2022. Disponible en: www.cepal.org/apps.
9. Max Roser, Hannah Ritchie, Bernadeta Dadonaite. Child and Infant Mortality. 2013 [citado el 16 de marzo de 2023]; Disponible.
10. Banco Mundial. Tasa de mortalidad, menores de 5 años (por cada 1.000) [Internet]. 2023 [citado el 14 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://datos.bancomundial.org/indicador/SH.DYN.MORT>.
11. DANE. Principales resultados de Estadísticas Vitales nacimientos y defunciones para el cuarto trimestre de 2022pr, acumulado del año 2022pr y el año corrido de 2023.
12. Instituto Departamental de Salud. Informe de evento. Vigilancia integrada de las muertes en menores de 5 años por Infección Respiratoria Aguda (IRA), Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) o Desnutrición Aguda (DNT). A periodo epidemiológico XIII de 2023 [Internet]. 2023. Disponible en https://ids.gov.co/2023/DIMENSIONES/INF_EISP_NSDER_A%C3%91O_2023.pdf.
13. Instituto Departamental de Salud. Informe de evento. Vigilancia integrada de las muertes en menores de 5 años por Infección Respiratoria Aguda (IRA), Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) o Desnutrición Aguda (DNT). A periodo epidemiológico XIII de 2023 [Internet]. 2023. Disponible en https://ids.gov.co/2023/DIMENSIONES/INF_EISP_NSDER_A%C3%91O_2023.pdf