







Gobernación
de Norte de
Santander



Informe de evento

SÍFILIS CONGÉNITA

X

Período Epidemiológico: Sem 01 -40
fecha de corte a 4 de Octubre de
2025

Comportamiento Sociodemográficos de interés, Norte de Santander, periodo epidemiológico X, 2025.



Cabecera Municipal
80%

Centro Poblado
15 %

Rural Disperso
5%



Subsidiado
80%

Contributivo 7,5%

No Asegurado
12,5%



Mujer
45%




Hombre
55%

Pertenencia étnica

Otros:
97,5%

Indígena
2,5 %

Condición de la madre en el momento del Diagnóstico , Norte de Santander, periodo epidemiológico X, 2025.



Incidencia de casos de Sífilis Congénita por Municipio de Residencia, Nacionalidad, Norte de Santander, periodo epidemiológico X, 2025.

Municipio de Residencia	Nacionalidad de la marde Casos COL.	Nacionalidad de la madre Casos VEN.	Total General SE.1-40	Porcentaje NV+DF	Incidencia X 1000 NV.	Sem 37-40	
Cúcuta	9	12	21	52,5	9895	2,1	3
Ocaña	4	0	4	10	1729	2,3	0
Tibú	1	3	4	10	1496	2,7	0
Villa Del Rosario	2	2	4	10	1228	3,3	0
Sardinata	1	1	2	5	383	5,2	0
Ábrego	1	0	1	2,5	377	2,7	0
Convención	1	0	1	2,5	273	3,7	0
El Zulia	1	0	1	2,5	457	2,2	0
San Calixto	0	1	1	2,5	126	7,9	1
San Cayetano	1	0	1	2,5	72	13,9	0
Norte de Santander	21	19	40	100	20449	2,0	4

Fuente Sivigila 2025

Casos de Sífilis congénita según su aseguramiento , Nacionalidad, Norte de Santander, periodo epidemiológico X, 2025.

Aseguradora	Nacionalidad de la marde Casos COL.	Nacionalidad de la madre Casos VEN.	Total General SE.1-40	porcentaje	Sem 37-40
Nueva Eps	12	11	23	57,5	3
Comfaorient	5	2	7	17,5	1
No Afiliado	1	4	5	12,5	0
Coosalud	2	1	3	7,5	0
Sanitas	1	1	2	5	0
Norte de Santander	21	19	40	100	4

Nota: los datos están sujetos a ajustes en la variable de nacionalidad para la población no asegurada.

Fuente Sivigila 2025

Ficha técnica

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por Treponema pallidum, puede transmitirse de la madre al feto durante el embarazo (sífilis congénita). En la mayoría de los casos, esta enfermedad puede prevenirse y curarse fácilmente con tratamiento de antibiótico.

La sífilis congénita puede tener consecuencias devastadoras, incluyendo la muerte fetal o neonatal, parto prematuro, bajo peso al nacer y problemas de salud crónicos en el neonato infectado.

Análisis de comportamientos inusuales: La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

Los indicadores de vigilancia del evento se calcularon con la información disponible en SIVIGILA del año 2025 y teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el protocolo de vigilancia de Sífilis Congénita, entre las fuentes utilizadas DANE año 2023.

Las variables presentadas incluyen las definidas en la ficha de datos básicos y complementarios del evento.