




FIEBRE AMARILLA



¡Protégete y protege a tu
comunidad! La prevención
de la Fiebre Amarilla está en
tus manos.



INTRODUCCIÓN

La Fiebre Amarilla es una enfermedad grave causada por un virus que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados, especialmente de los géneros Aedes y Haemagogus. Aunque puede prevenirse con vacunación, sigue afectando a personas en áreas tropicales y subtropicales, incluyendo zonas de Colombia. Es importante conocer cómo se manifiesta y cómo podemos protegernos.



¿QUÉ ES LA FIEBRE AMARILLA?




Es una enfermedad que provoca fiebre alta, pero no causa brotes en la piel. Se llama "amarilla" porque puede hacer que la piel y los ojos se vuelvan de ese color debido a un problema en el hígado. En Colombia, se encuentra sobre todo en áreas selváticas y rurales, donde hay más mosquitos que pueden transmitirla.





¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?




Los síntomas aparecen de 3 a 6 días después de la picadura y pueden variar de leves a graves. Algunos de ellos son:



COMPLICACIONES GRAVES

Si la enfermedad no se trata a tiempo, puede causar problemas muy serios, como:

- Insuficiencia hepática y renal
- Hemorragias internas
- Shock y falla de muchos órganos
- En casos graves, la enfermedad puede ser mortal, con una tasa de hasta el 80% en algunos brotes.



¿CÓMO PREVENIR LA FIEBRE AMARILLA?

VACÚNATE

Es la mejor forma de prevenir la Fiebre Amarilla. La vacuna es gratuita, segura y dura toda la vida. Se recomienda vacunarse al menos 10 días antes de viajar a zonas de riesgo. Está dirigida a cualquier persona entre 1 y 59 años de edad




VACÚNATE

En algunas regiones, se administra la vacuna contra la Fiebre Amarilla a los 12 meses en lugar de los 18 meses.

¿CÓMO PREVENIR LA FIEBRE AMARILLA?

Eliminar criaderos de mosquitos: No dejar agua estancada en llantas, baldes o floreros.



Usar protección personal: Aplicar repelente, usar ropa de manga larga y dormir con mosquitero.

Informarse y educar a los demás: Conocer los síntomas y acudir al médico ante cualquier señal de la enfermedad.



¿QUÉ HACER SI PRESENTA SÍNTOMAS?



Si presentas fiebre alta, dolor de cabeza intenso, vómitos o piel amarillenta después de estar en una zona de riesgo, busca atención médica inmediatamente y comenta si estuviste en áreas con presencia del mosquito transmisor. Si hay antecedentes de viaje a zonas endémicas, notifica al personal de salud para que evalúe posibles complicaciones.



Revcom

Red de Vigilancia Epidemiológica
Basada en Comunidad



ACTIVIDAD

Encuentra las palabras clave:

Rodea en la siguiente lista las palabras relacionadas con la prevención de la Fiebre Amarilla:

o Vacunación

o Repelente

o Hemorragia

o Ictericia

o Mosquitero

Completa la frase: La mejor forma de prevenir la Fiebre Amarilla es

-----.



¡Vacúnate y
protege a tu
comunidad!
Juntos podemos
prevenir la Fiebre
Amarilla.