

2013



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

BOLETÍN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN


OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES

Con colaboración de:

Dirección de Epidemiología y Demografía

Sistema de Seguimiento de los ODM – Salud Colombia

Dirección de Promoción y Prevención



INTRODUCCIÓN

En el año 2000 se llevó a cabo la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, en la cual 189 jefes de Estado del mundo firmaron la Declaración del Milenio con base en la cual se concertaron ocho propósitos de desarrollo humano a ser alcanzados en el 2015, denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Estado Colombiano presentó metas específicas para cada uno de los Objetivos en el documento Conpes Social 91 del 14 de marzo de 2005, el cual fue modificado por el Conpes 140 de 2011 derivado de la actualización de líneas base y metas para algunos indicadores. Así mismo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 *Prosperidad para Todos*, se incluyeron metas relacionadas con estos mismos indicadores a ser alcanzadas en el 2014.

Faltando dos años para cumplirse el plazo pactado para el cumplimiento de los Objetivos, este boletín busca mostrar el comportamiento en los últimos años de los indicadores relacionados con el sector salud respecto a las metas establecidas.

OBJETIVOS


OBJETIVO 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE

META UNIVERSAL: 1C. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre

META NACIONAL: Acceso a una alimentación adecuada y suficiente

INDICADORES


Prevalencia de desnutrición global (bajo peso para la edad) en menores de 5 años



Los 5 departamentos más críticos respecto al promedio nacional en el 2010 fueron: La Guajira (11,2%), Magdalena (6.8%), Chocó (6.3%), Guainía (6.10%) y Amazonas (5.8%).

Fuente: Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia - ENSIN / patrones de crecimiento de la OMS en Colombia. *La Meta del PND 2014 coincide con la meta establecida para el 2015 en CONPES 140

Prevalencia de desnutrición crónica (retraso en talla para la edad) en menores de 5 años



Los 5 departamentos más críticos respecto al promedio nacional en el 2010 fueron: Vaupés (34,6%); Amazonas (28,6%); La Guajira (27,9%); Guainía (23,4%); Cauca (23%)

Fuente: Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia – ENSIN / patrones de crecimiento de la OMS en Colombia. *La Meta del PND 2014 coincide con la meta establecida para el 2015 en CONPES 140

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer



Los 5 departamentos más críticos respecto al promedio nacional en el 2010 fueron: Bogotá (12,95%), Cundinamarca (10,65%), Chocó (9,76%), Antioquia (9,57%), Boyacá (9,53%)

Fuente: Estadísticas Vitales del DANE. *La Meta del PND 2014 coincide con la meta establecida para el 2015 en CONPES 140

OBJETIVO 4: REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS

META UNIVERSAL: 4A. Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años

META NACIONAL: Reducir en dos terceras partes la mortalidad infantil y en la niñez

INDICADORES

Tasa de mortalidad en la niñez -menores de 5 años- ajustada (por mil nacidos vivos)




Fuente: Estadísticas Vitales del DANE. *Meta del PND ** Meta CONPES 140

Tasa de mortalidad infantil -en menores de 1 año- ajustada (por mil nacidos vivos)



Fuente: Estadísticas Vitales del DANE. *Meta del PND ** Meta CONPES 140

Cobertura de vacunación con DPT en menores de 1 año




Los 5 departamentos más críticos respecto al promedio nacional en el 2012 fueron: Vichada (47,1%), Guaviare (56,4), Vaupés (62%), Guainía (63,9), Chocó (72,2%)

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - PAI

*En el año 2012 se realiza una revisión metodológica de los resultados de las coberturas del Programa Ampliado de Inmunizaciones, por lo que se presenta el resultado con Nacidos vivos ajustados por cabalidad

** La Meta del PND 2014 coincide con la meta establecida para el 2015 en CONPES 140

Cobertura de vacunación con triple viral en niños de 1 año



Los 5 departamentos más críticos respecto al promedio nacional en el 2012 fueron: Guaviare (59,9%), Vaupés (69,7), Vichada (70,6%), Atlántico (78,7), Caquetá (79,1%)

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - PAI

*En el año 2012 se realiza una revisión metodológica de los resultados de las coberturas del Programa Ampliado de Inmunizaciones, por lo que se presenta el resultado con Nacidos vivos ajustados por cabalidad

** La Meta del PND 2014 coincide con la meta establecida para el 2015 en CONPES 140


OBJETIVO 5: MEJORAR LA SALUD MATERNA

META UNIVERSAL: 5A. Reducir, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes

META NACIONAL: Reducir a la mitad la tasa de mortalidad materna

INDICADORES

Razón de mortalidad materna a 42 días (Por 100.000 nacidos vivos)




Los 5 departamentos más críticos respecto al promedio nacional en el 2010 fueron: Putumayo (242,19), Caquetá (194,34), Chocó (178,67), La Guajira (154,95), Córdoba (146,84)

Fuente: Estadísticas Vitales del DANE.

*El dato del 2008 está en revisión

Meta del PND 2014 * Meta CONPES 140


Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales



Los 5 departamentos más críticos respecto al promedio nacional en el 2010 fueron: Vaupés (28,21%), Guainía (47,8%), Amazonas (48,49%), Vichada (52,66%) y Guaviare (56,74%)

Fuente: Estadísticas Vitales del DANE. *Meta del PND ** Meta CONPES 140


Porcentaje de atención institucional del parto



Los 5 departamentos más críticos respecto al promedio nacional en el 2010 fueron: Vaupés (46,59%), Amazonas (81,6%), Vichada (82,72%), Guainía (87,46%), Arauca (90%)

Fuente: Estadísticas Vitales del DANE. **Las metas del PND y CONPES 140 no se deben interpretar como una reducción a lograr para el 2014 y 2015, sino como que las mismas se lograron anticipadamente.

Porcentaje de partos atendidos por personal calificado



Los 5 departamentos más críticos respecto al promedio nacional en el 2010 fueron: Vaupés (47,23%), Amazonas (80,9%), Vichada (81,66%), Guainía


Fuente: Estadísticas Vitales del DANE. **Las metas del PND y CONPES 140 no se deben interpretar como una reducción a lograr para el 2014 y 2015, sino como que las mismas se lograron anticipadamente

META UNIVERSAL: 5B. Lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva

META NACIONAL: Aumentar la promoción de la salud sexual y reproductiva


INDICADORES

Porcentaje de uso de métodos modernos de anticoncepción entre las mujeres de 15 a 19 años, actualmente unidas y no unidas sexualmente activas




Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS Profamilia. *Meta del PND ** Meta CONPES 140. Las Metas se definieron como un indicador compuesto de mujeres unidas y no unidas.

Porcentaje de uso de métodos modernos de anticoncepción en las mujeres actualmente unidas y no unidas sexualmente activas



Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS Profamilia. *Meta del PND ** Meta CONPES 140. Las Metas están definidas para las mujeres Unidas y no Unidas.

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que son madres o están embarazadas por primera vez



Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS Profamilia. *La Meta del PND 2014 coincide con la meta establecida para el 2015 en CONPES 140

Tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino ajustada por edad (por 100.000 mujeres)



Fuente: Estadísticas vitales del DANE (EEVV-DANE). Cálculos: Grupo de vigilancia Epidemiológica de Cáncer, Instituto Nacional de Cancerología. *Meta del PND ** Meta CONPES 140


OBJETIVO 6: COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES

META UNIVERSAL: 6A. Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA

META NACIONAL: Mantener por debajo de los límites definidos internacionalmente la prevalencia concentrada de VIH/SIDA


INDICADORES

Prevalencia de VIH/SIDA en población de 15 a 49 años




Fuente: Panorama del VIH/sida en Colombia 1983 – 2010. Un análisis de situación. * La Meta del PND coincide con la meta establecida para el 2015 en CONPES 140

Tasa de mortalidad por VIH/SIDA (Por 100.000 habitantes)



Fuente: Estadísticas Vitales-DANE. No se definió meta 2015 en CONPES 140

Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH




Fuente: Informe transmisión Materno Infantil del VIH- Ministerio de Salud y Protección Social. *La Meta del PND coincide con la meta establecida para el 2015 en CONPES 140

META UNIVERSAL: 6B: Lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo necesiten

META NACIONAL: Aumentar la cobertura de terapia antirretroviral

INDICADORES

Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/SIDA




Fuente: Observatorio Nacional de la Gestión en VIH. *La Meta del PND coincide con la meta establecida para el 2015 en CONPES 140.


META UNIVERSAL: 6C: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia de paludismo y otras enfermedades graves

META NACIONAL: Reducir los casos de malaria y dengue

INDICADORES




Fuente: Estadísticas Vitales-DANE. *Meta del PND ** Meta CONPES 140



Fuente: Estadísticas Vitales-DANE. *Meta del PND ** Meta CONPES 140

Letalidad por dengue



Fuente: SIVIGILA. *La Meta del PND coincide con la meta establecida para el 2015 en CONPES 140

CONSOLIDADO TERRITORIOS CRÍTICOS

INDICADOR	Amazonas	Antioquia	Arauca	Atlántico	Bogotá D.C.	Boyacá	Cundinamarca	Caquetá	Cauca	Chocó	Córdoba	Guainía	La Guajira	Guaviare	Huila	Magdalena	Nte. Santander	Putumayo	Risaralda	Tolima	Valle	Vaupés	Vichada	Nacional	
Prevalencia de desnutrición global en < de 5 años (%)	5,8									6,3		6,1	11,2			6,8									3,4
Prevalencia de desnutrición crónica en < de 5 años (%)	28,6								23			23,4	27,9										34,6		13,2
% de nacidos vivos con bajo peso al nacer		9,57			12,9	9,5	10,7			9,76															9,0
Tasa de mortalidad en la niñez - < de 5 años- ajustada (por mil nacidos vivos)									34,6		54,5		48,0		40,3		35,0								21,2
Tasa de mortalidad infantil -en < de 1 año- ajustada (por mil nacidos vivos)	46,9									43,93		37,30											42,1	36,5	18,4
Cobertura de vacunación con DPT en < de 1 año (%)										72,2		63,9		56,4									62,0	47,1	91,4
Cobertura de vacunación con triple viral en niños de 1 año (%)				78,7				79,1						59,9									69,7	70,6	93,6
Razón de mortalidad materna a 42 días (Por 100.000 nacidos vivos)								194,3		178,7	146,8		155,0					242,2							71,6
% de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales	48,5											47,8		56,7									28,2	52,7	86,3
% de atención institucional del parto	81,1		90,0									87,5											46,6	82,7	98,6
% de partos atendidos por personal calificado	80,9		90,2									86,9											47,2	81,7	98,7
Mortalidad por malaria (No. de casos)		8								11												5			41
Mortalidad por dengue (No. de casos)		19															17		16	23	29				230